Obesitas Platform.nl

Wanneer worden liraglutide en naltrexon/bupropion vergoed?

STARTPUNT

Dit schema gaat over vergoeding uit de basisverzekering voor volwassenen. Medicatie is een aanvulling op leefstijlbehandeling, niet een vervanging daarvan.

De zorgverzekeraar bepaalt welk merk liraglutide vergoed wordt!

Eerst minimaal 1 jaar actief deelnemen aan een erkende GLI

- De GLI moet door het RIVM erkend zijn en duurt in totaal 2 jaar.
- Zowel in het eerste als in het tweede jaar is actieve deelname met voldoende inzet nodig.
- Na minimaal 1 jaar GLI kan medicatie worden overwogen als het resultaat onvoldoende is.
- De BMI-criteria hieronder gelden op het moment dat de medicatie wordt voorgeschreven.
- Voor 'onvoldoende resultaat' geldt volgens ZN: **<5% gewichtsverlies** bij matig verhoogd GGR en **<10%** bij sterk verhoogd GGR. Bij de hogere BMI/GGR-groepen betekent dit dus: tijdens de GLI minder dan 10% gewichtsverlies.
- Na start van medicatie wordt de GLI voortgezet tot het einde van het 2-jarige traject.

Liraglutide (Saxenda, Vobexoryn, Byesilor, Nevolat)

BMI ≥ 40
OF
BMI ≥ 35 + hart- en vaatziekte, slaapapneu en/of artrose.

De BMI wordt beoordeeld bij de start van de medicatie.

Extra controle vóór liraglutide

Niet passend voor deze vergoeding bij:

- diabetes mellitus type 2;
- status na metabole/bariatrische chirurgie.

Iemand die een operatie niet wil, maar er volgens de richtlijn wel voor in aanmerking komt, kan onder voorwaarden toch medicatie krijgen.

Start liraglutide na 1 jaar GLI

Arts vult de actuele ZN-artsenverklaring in. Startgewicht wordt vastgelegd. De GLI loopt door tot het einde van het traject.

Doorgaan met liraglutide?

Na **3 maanden** gebruik van de onderhoudsdosering moet het gewicht **>5% lager** zijn dan bij de start. Zo niet: stoppen.

De actuele ZN-verklaring vraagt opnieuw om beoordeling; bij chronisch gebruik volgt periodieke herbeoordeling.

Actuele ZN-verklaring liraglutide (Saxenda)

Voor online versturen ZN verklaring: Zneller.nl

Naltrexon/bupropion (Mysimba)

BMI ≥ 30
OF
BMI ≥ 27 en < 30 + (risico op) hart- en vaatziekte, diabetes type 2, slaapapneu en/of artrose.

De BMI wordt beoordeeld bij de start van de medicatie.

Extra controle vóór naltrexon/bupropion

De vergoedingsvoorwaarden sluiten diabetes type 2 niet uit en noemen bariatrie niet als aparte uitsluiting.

De arts controleert daarnaast medische contra-indicaties en interacties.

Start naltrexon/bupropion na 1 jaar GLI

Arts vult de actuele ZN-artsenverklaring in. Startgewicht wordt vastgelegd. De GLI loopt door tot het einde van het traject.

Doorgaan met naltrexon/bupropion?

Na **4 maanden** gebruik van de onderhoudsdosering moet het gewicht **>5% lager** zijn dan bij de start. Zo niet: stoppen.

De actuele ZN-verklaring vraagt opnieuw om beoordeling; na 24 maanden chronisch gebruik volgt herbeoordeling.

Actuele ZN-verklaring naltrexon/bupropion (Mysimba)

Voor online versturen ZN verklaring: Zneller.nl

Bronnen: Zorgverzekeraars Nederland (actuele artsenverklaringen en Q&A farmacotherapie bij overgewicht/obesitas). Let op: de grens voor onvoldoende GLI-resultaat is afhankelijk van het gewichtsgerelateerde gezondheidsrisico (GGR); controleer daarom altijd de actuele ZN-voorwaarden.